



BANDERAS ROJAS EN HEPATITIS AGUDAS

Dr Julio N. Miljević

HISTORIA DE

- 1- Hepatitis en contexto de consumo de alcohol (Referencia UT 28-7)
 - Hepatitis alcohólica
- 2- Hepatitis aguda en contexto de consumo de paracetamol a dosis igual o > de 2 gramos en personas con antecedentes de enfermedad hepática crónica o SIDA- Precaución en tratamiento para TBC
 - Falla hepática fulminante por acetaminofén a dosis “terapéuticas”
- 3- Hepatitis por fármacos o tóxicos potencialmente graves
 - Dosis tóxicas de paracetamol
 - Hepatitis por tuberculostáticos
 - otros
- 4- Hepatitis aguda y embarazo (UT 28-4/ Artículo 2 y 3)
 - Hepatitis víricas hepatotrópicas y no hepatotrópicas
 - DD con hepatopatías del embarazo
 - Síndrome HELLP
 - Hígado graso agudo del embarazo
- 5- Hepatitis aguda en inmunodeprimidos
 - Inmunodepresión celular
 - Inmunodepresión humoral
 - Mixta
 - Neutropenia

CLINICA DE

- 1- Hepatitis febriles (Referencia UT 28-2)
- 2- Hepatitis y dolor abdominal agudo/ abdomen agudo
- 3- Hepatitis aguda con clínica de encefalopatía
- 4- Hepatitis + criterios de disfunción orgánica múltiple
- 5- Hepatitis + criterios de falla hepática fulminante
 - Referencia UT 28-3/Artículo 1- Práctica Clínica en Gastroenterología y hepatología- Cap 52
- 6- Hepatitis y descompensación hemodinámica
 - Hepatitis isquémica o Hepatitis hipóxica



RESUMEN

-
- Hepatitis Febriles
 - Hepatitis toxicas
 - Hepatitis isquémicas- hipóxicas
 - Hepatitis fulminante
 - Hepatitis inmunodeprimidos
 - Hepatitis embarazo